

EDTA-spoeling

Oogheelkunde

Inleiding

U heeft een afspraak bij de afdeling Oogheelkunde voor een EDTA-spoeling bij bandkeratopathie. Deze folder geeft algemene informatie over deze aandoening en de behandeling.

Wat is bandkeratopathie?

Wanneer er een witte / grijze band in het heldere hoornvlies ontstaat, wordt dit bandkeratopathie genoemd. Dit ontstaat doordat er kalkkristallen in het oppervlakkige deel van het hoornvlies neerslaan. Dit kan komen door een verhoogd calciumgehalte in het bloed (bijvoorbeeld door afwijkingen aan de bijnier of nieren), door een chronische ontsteking in het oog, bepaalde operaties of medicatie. Deze afzetting begint vaak aan de rand van het hoornvlies en neemt richting het centrum langzaam toe en kan leiden tot klachten als wazig zicht of last van fel licht.

Vorbereiding

Houd bij de voorbereiding van de afspraak rekening met het volgende:

- neem uw identiteitsbewijs mee;
- u hoeft thuis geen speciale voorbereidingen te treffen. U mag van tevoren gewoon eten en drinken;
- wij vragen u om een begeleider mee te nemen, die u na de ingreep naar huis kan brengen. Door de behandeling is zelfstandig naar huis reizen per auto, fiets of openbaar vervoer niet verantwoord.

Wat is een EDTA-spoeling?

EDTA staat voor ethyleendiaminetetra-azijnzuur, dit is de vloeistof die bij deze spoeling wordt gebruikt.

De behandeling

Na verdoving van uw oog met druppels, worden de oogleden en het oog gedesinfecteerd. Er wordt een doek over uw gezicht gelegd en een spreidertje tussen de oogleden geplaatst, zodat u tijdens de ingreep het oog open houdt. Een gedeelte van het oppervlak van uw hoornvlies wordt verwijderd, waarna met een EDTA vloeistof de kalk in uw hoornvlies wordt opgelost, waardoor deze weer helder wordt. Aan het eind van de ingreep wordt meestal een contactlens geplaatst, zodat het hoornvlies sneller geneest en u minder pijn heeft. Er kan ook voor gekozen worden om het oog dicht te plakken met zalf op uw oog en een oogverband. Laat dit verband ongeveer een halve dag zitten.

Na de behandeling

De periode na de ingreep kunt u pijnklachten krijgen. Wij raden u dan ook aan om paracetamol in te nemen (tenzij er een reden is dat u dit niet kunt verdragen of mag innemen), tot maximaal vier maal daags twee tabletten van 500 mg. Mocht u ondanks de paracetamol veel pijn houden, dan kan in overleg met de oogarts andere pijnstilling worden afgesproken.

Controleafspraak

U krijgt na deze ingreep een controleafspraak waarbij, indien van toepassing, de contactlens wordt verwijderd en het resultaat van de operatie wordt beoordeeld.

(Pijn)klachten

Heeft u ernstige pijnklachten of andere vragen, dan kunt u contact opnemen met de polikliniek Oogheelkunde. 's Avonds of in het weekend belt u met de Centrale Receptie van Medisch Spectrum Twente, vraagt u naar de dienstdoende oogarts.

Mogelijke complicaties

Een mogelijke complicatie na deze verrichting is een infectie.



Belangrijke contactadressen

- polikliniek Oogheelkunde, route C05, telefoon (053) 487 27 30;
- Centrale Receptie Medisch Spectrum Twente, telefoon (053) 487 20 00.

Tenslotte

U heeft recht op juiste en volledige informatie. Pas als u voldoende inzicht heeft, kunt u weloverwogen toestemming geven voor een bepaalde behandeling of een bepaald onderzoek. Als iets u niet geheel duidelijk is, vraagt u de behandelend arts of verpleegkundige dan om nadere uitleg.