

Behandeling met immunotherapie **ACHILLES STUDIE: Atezoluzimab (1437)**

Inleiding

U heeft een afspraak bij longgeneeskunde voor een chemokuur. Deze folder geeft algemene informatie over deze behandeling.

Behandeling

Deze kuur bestaat uit een soort immunotherapie. Daarnaast worden nog enkele andere medicijnen voorgeschreven. Deze dienen ter ondersteuning van de behandeling, bijvoorbeeld om bijwerkingen te beperken.

Indien er geen toename van ziekte is en u de behandeling goed verdraagt, wordt de kuur een jaar lang gegeven met een interval van \pm 3 weken.

Opname

De immunotherapie wordt gegeven op de dagbehandeling E21

Labcontrole

Voor iedere chemokuur wordt bloed geprikt; hetzij een dag van tevoren of op de dag van een polibezoek aan uw longarts of verpleegkundig specialist. Het kan zijn dat de bloeduitslagen onvoldoende zijn voor een volgende kuur. Dan wordt een chemokuur uitgesteld. Dit gebeurt vaker en heeft geen nadelige gevolgen voor het effect van de behandeling. De radiotherapie gaat wel gewoon door volgens planning.

Beeldvorming

Na iedere 4 kuren wordt er in overleg met uw behandelend specialist een CT-scan gepland. Uw specialist kan u hier meer over vertellen.

Besmetting

Resten van de chemotherapie kunnen 8 dagen na de toediening vanaf dag 1 in het lichaamsvocht (onder meer urine, ontlasting, sperma, braaksel en transpiratie) aanwezig zijn. In het ziekenhuis krijgt u adviezen hoe u hiermee kunt omgaan.

De volgende kuur start in principe 3 weken na dag 1 van de chemokuur, als de bloeduitslagen goed zijn.

Bijwerkingen

Bij deze kuur kunnen bijwerkingen optreden; is dit het geval neem dan contact op met uw behandelend arts/ verpleegkundig specialist of oncologieverpleegkundige (casemanager).

De volgende bijwerkingen kunnen optreden:

- Infuusreacties
- Gewrichtspijn
- Rugpijn
- Skeletspierpijn
- Koorts
- Longontsteking
- Verstopte neus
- buikpijn
- Urineweginfecties
- Het kan zijn dat u tijdelijk minder of geen trek heeft in eten.
- Uw smaak kan tijdelijk veranderen.
- Deze kuur kan misselijkheid en braken veroorzaken.

- Het slijmvlies van de mond kan ontstoken raken. U kunt daardoor blaasjes en pijn in de mond krijgen. Belangrijk is een goede mondverzorging.
- Het slijmvlies van de darm kan geïrriteerd raken. U kunt daardoor diarree krijgen.
- Deze kuur kan vermoeidheid veroorzaken; ook na afloop van de gehele behandeling kunnen deze klachten aanhouden.
- Huiduitslag
- Jeuk
- Griepachtige verschijnselen en rillingen

SCHEMA IMMUNOTHERAPIE
IMMUNOTHERAPIE VIA INFUUS

Immunotherapie	DAG 1	Duur kuur
Atezolizumab	•	infuus 1 uur

MEDICATIE IN TABLETVORM RONDOM DE CHEMOKUUR

Dag van de kuur DAG 1	1 uur voor de kuur innemen
Granisetron 2 mg	1 x 1 tabletten

DAG 2 en volgende
Bij misselijkheid zo nodig Metoclopramide maximaal 3 x daags 10 mg een half uur voor de maaltijd

Belangrijke telefoonnummers / contactgegevens

- Binnen kantooruren: Poli longgeneeskunde: 053-4872610
- Buiten kantooruren: Receptie MST: 053-4872000

Aanvullende informatie

- Op de website van de patiëntenvereniging <https://www.longkankernederland.nl>

Tenslotte

U heeft recht op juiste en volledige informatie. Pas als u voldoende inzicht heeft, kunt u weloverwogen toestemming geven voor een bepaalde behandeling of een bepaald onderzoek. Als iets u niet geheel duidelijk is, vraagt u de behandelend arts of verpleegkundige dan om nadere uitleg.