

Sedatie bij gynaecologische behandelingen / onderzoeken

Gynaecologie

Inleiding

U heeft een afspraak bij de Gynaecologie voor een behandeling / onderzoek onder sedatie (het opzettelijk verlagen van het bewustzijn). Deze folder geeft algemene informatie over sedatie en beschrijft waar u rekening mee moet houden.

Wat is een sedatie?

Sedatie, het met medicijnen verlagen van het bewustzijn, wordt gebruikt om het onderzoek minder belastend voor u te maken. U krijgt het slaapmiddel Propofol en eventueel een pijnstiller toegediend. Hoe slaperig u wordt, is niet te voorspellen. De meeste mensen herinneren zich naderhand weinig tot niets van het onderzoek. U krijgt alleen sedatie na overleg met uw arts, die het onderzoek aanvraagt.

Vorbereiding

Houdt bij de voorbereiding rekening met het volgende:

- gebruikt u medicatie, neemt u dan een actuele medicatielijst mee;
- blijf uw eigen medicatie innemen, ook de medicijnen die de bloedstolling beïnvloeden, tenzij uw arts dit anders met u heeft overlegd;
- moet u medicijnen innemen voor de behandeling (dit kunt u lezen in de folder over uw behandeling / onderzoek), dan heeft uw arts het recept naar uw apotheek gestuurd en kunt u de medicijnen daar ophalen. In sommige gevallen kunt u deze zelf kopen bij uw apotheek (zoals paracetamol en diclofenac);
- draag geen nagellak en / of kunstnagels, sieraden, piercings, horloges of foundation. Heeft u acrylnagels, dan moet u er één laten verwijderen. De kleur van de huid en uw nagels geeft de anesthesioloog tijdens de operatie belangrijke informatie over uw lichamelijke toestand;
- nadat u zich gemeld heeft, wordt u ontvangen in de zogenoemde bewakingsruimte. Hier krijgt u een ochtendjas aan en er wordt een infuusnaald ingebracht in een ader in de arm of hand. Het is raadzaam om makkelijk zittende bovenkleding te dragen, aangezien u deze tijdens de behandeling aanhoudt. Neem ook pantoffels of slippers mee, zodat u niet op blote voeten naar de behandelruimte hoeft te lopen;
- neem een begeleider mee, die u na de ingreep naar huis brengt. Door de behandeling is zelfstandig reizen per auto, fiets of openbaar vervoer niet verantwoord. De begeleider mag niet aanwezig zijn tijdens de behandeling.

Nuchter zijn

Het is belangrijk dat u voor de opname nuchter bent. Dat wil zeggen dat u zes uur vóór de behandeling / onderzoek niet meer mag eten. Wel mag u tot twee uur voor de operatie helder vloeibaar drinken (aanmaaklimonade, appelsap, koffie / thee (zonder melk), bouillon of water) gebruiken. Medicijnen mag u met een slok water innemen.

Behandeling / onderzoek

Informatie over uw onderzoek leest u in de folder die u daarover al heeft gekregen. Tijdens de behandeling / onderzoek worden uw vitale functies (hartslag, ademhaling, temperatuur en bloeddruk) gecontroleerd door de sedatiespecialist.

Na de behandeling / onderzoek

Na de behandeling / onderzoek brengt een verpleegkundige u naar de uitslaapkamer. U blijft hier ongeveer een uur ter observatie na de behandeling/onderzoek. Hierna wordt de infuusnaald verwijderd. De medicatie die voor de sedatie gebruikt worden, verminderen uw reactie- en inschattingsvermogen.

De eerste 24 uur na het onderzoek mag u niet:

- alcoholische dranken gebruiken;
- belangrijke beslissingen nemen;
- gevaarlijke machines bedienen;
- actief aan het verkeer deelnemen (u bent dan niet verzekerd);

U moet zelf begeleiding en vervoer naar huis regelen. Laat u door uw begeleider ophalen bij de Poliklinische Operatiekamer Gynaecologie; u mag de afdeling niet zelfstandig verlaten!

U mag na het onderzoek beginnen met eten en drinken.

Heeft u na de ingreep veel pijn, dan mag u paracetamol (500 mg) innemen tot maximaal vier maal daags één of twee tabletten.

Controleafspraak

U krijgt een controleafspraak mee voor na de ingreep. Kunt u de gemaakte afspraak niet nakomen, geeft u dit dan tijdig door aan het secretariaat Gynaecologie, telefoon (053) 4 87 23 30.

(Pijn)klachten

Heeft u wondproblemen, ernstige pijnklachten of andere vragen, dan kunt u altijd contact opnemen met de Gynaecologie, telefoon tijdens kantooruren (053) 4 87 23 30. Bij acute problemen 's avonds en in het weekend kunt u contact opnemen met de dienstdoende arts-assistent Gynaecologie, bereikbaar via het centrale nummer van ons ziekenhuis, telefoon (053) 4 87 20 00.

Mogelijke complicaties

Zoals bij iedere ingreep, kunnen ook bij deze behandeling / onderzoek complicaties optreden. Gelukkig komen deze niet vaak voor en kunnen ze meestal verholpen of behandeld worden.

Mogelijke complicaties staan in de folder van de betreffende behandeling / onderzoek.

Bij sedatie ontstaan in enkele gevallen problemen met de ademhaling of de hartfunctie. Dit komt voor bij één tot zes op de duizend patiënten. Deze problemen zijn meestal goed te behandelen met medicijnen of het toedienen van zuurstof. In sommige gevallen, bijvoorbeeld bij een slechte hart- en / of longfunctie, kan de arts besluiten af te zien van sedatie vanwege het risico op complicaties.

Belangrijke contactgegevens

Onderstaand telefoonnummer kan voor u van belang zijn:

- Gynaecologie, route H03, telefoon (053) 4 87 23 30.

Tenslotte

U heeft recht op juiste en volledige informatie. Pas als u voldoende inzicht heeft, kunt u weloverwogen toestemming geven voor een bepaalde behandeling of een bepaald onderzoek. Als iets u niet geheel duidelijk is, vraagt u de behandelend arts of verpleegkundige dan om nadere uitleg.