

Beste ouders/ verzorgers,

Hierbij informeren wij jullie over afspraak voor een longfunctiemeting bij de poli kindergeneeskunde op:

.....

Vorbereiding

Voor de afspraak bij de polikliniek moeten jullie het volgende mee te nemen:

- een geldig legitimatiebewijs van je kind, bijvoorbeeld een paspoort of een identiteitskaart;
- informatie van de zorgverzekeraar of de zorgpas;
- deze afspraakbevestiging.

Overige mededelingen:

- Het kan zijn dat je kind bepaalde medicatie moet staken voor de longfunctiemeting, tenzij anders afgesproken met de kinderarts (zie pagina 2 van deze brief voor een overzicht van deze medicatie).

Verloop van de longfunctiemeting

Tijdens de longfunctie meting wordt er gekeken naar de snelheid en de hoeveelheid lucht die je kind kan uitblazen. Bij de meting wordt je kind gevraagd om diep in te ademen en krachtig en lang door een buisje uit te blazen. Deze meting wordt een aantal keer herhaald.

De longfunctiespecialist geeft uitgebreid instructie over hoe de meting gaat. Voor jonge kinderen kan een animatie ondersteuning geven bij de test. Soms zal (wanneer aangevraagd door de kinderarts) na de test ook medicatie worden gegeven (salbutamol, blauwe puf) en worden de longfunctie metingen nogmaals herhaald.



Verhinderd?

Zijn jullie verhinderd? Wil je dit minimaal 24 uur van tevoren telefonisch door te geven. Je kunt ons bereiken op werkdagen tussen 08.00 uur en 17.00 uur, telefoon (053) 487 23 10.

Met vriendelijke groet,

Team Kindergeneeskunde

Longfunctieonderzoek

Te stoppen medicatie

Let op!

Deze folder geeft aan welke medicatie gestopt moet worden voor de longfunctietest. Heeft de (kinder)arts anders met je afgesproken (bijvoorbeeld om te testen onder de huidige medicatie) dan gaat het besluit van de kinderarts voor.

Verder is het belangrijk dat je kind voor een eventuele volgende afspraken zijn/haar medicatie **wel** neemt, tenzij jullie (kinder)arts anders aangeeft of jullie opnieuw deze lijst ontvangen.

Medicatie die gestopt moet worden

In onderstaande tabellen staat welke medicatie gestopt moet worden. Aangegeven is het aantal uren voor het onderzoek dat **geen** medicatie gebruikt mag worden.

Minimaal 8 uur	
<i>Merknaam</i>	<i>Generieke naam</i>
Aerolin, Airomir, Ventolin	Salbutamol
Atrovent, Ipraxa	Ipratropium (bromide)

Minimaal 12 uur	
<i>Merknaam</i>	<i>Generieke naam</i>
Berodual	Fenoterol / Ipratropium
Bricanyl	Terbutaline
Combivent, Combipramol, Ipramol	Ipratropium / Salbutamol

Minimaal 24 uur	
<i>Merknaam</i>	<i>Generieke naam</i>
Atimos, Foradil, Oxis	Formoterol
Eklira Genuair	Aclidinium
Flutiform	Fluticason / Formoterol
Foster	Beclometason / Formoterol
Serevent	Salmeterol
Seretide / AirFlusal / Aerivio	Fluticason / Salmeterol
Symbicort / Bufoler / DuoResp	Budesonide / Formoterol
Duaklir Genuair	Aclidinium / Formoterol
Singulair	Montelukast

Medicatie die gewoon kan worden door gebruikt.

Er is ook medicatie die de longfunctiemeting niet direct beïnvloeden. In onderstaande tabellen staat daarom welke medicatie wel door gebruikt mogen worden.

Long- / neusmedicatie die wel ingenomen mag worden

In onderstaande tabel staat welke medicatie wel gebruikt mag worden, tenzij de arts anders beslist.

Longmedicatie		Neussprays	
<i>Merknaam</i>	<i>Generieke naam</i>	<i>Merknaam</i>	<i>Generieke naam</i>
Alvesco	Ciclesonide	Allergocrom COMOD, Cromoglycaat, Prevalin	Cromoglicinezuur
Flixotide	Fluticason (propionaat)	Avamys, Flixonase	Fluticason (propionaat)
Lomudal	Cromoglicinezuur	Dymista	Azelastine / fluticason
Pulmicort	Budesonide	Nasonex	Mometason
Tilade	Nedocromil	Rhinocort	Budesonide
Qvar	Beclometason (dipropionaat)		
	Prednisolon		

Antihistamine (anti-allergie medicijnen) die wel ingenomen mag worden

In onderstaande tabel staat welke medicatie wel gebruikt mag worden, tenzij de arts anders beslist.

<i>Merknaam</i>	<i>Generieke naam</i>	<i>Merknaam</i>	<i>Generieke naam</i>
Allerfre, Claritine	Loratadine	Rupafin / Pupatadine	Rapatadine
Aerius, Neoclarityn	Desloratadine	Semprex	Acrivastine
Cinnarizine, anti allergie medicijn	Cinnarizine	Tavegyl	Clemastine
Fenistil	Dimetindeen	Telfast	Fexofenadine
Kestine	Ebastine	Xyzal	Levocetirizine
Mizollen	Mizolastine	Zaditen	Ketotifen
Nedeltran	Alimemazine	Zyrtec, Prevalin Allerstop, Reactine	Cetirizine
	Promethazine		

Aandachtspunten / opmerkingen

Komt de door je kind gebruikte long-, neus- of anti-allergie medicatie niet op deze lijst voor, overleg dan met de (kinder)arts over het wel/niet staken van deze medicatie.

Na het longfunctieonderzoek

Je kind mag na het onderzoek zijn/ haar eigen medicatie weer gebruiken, tenzij anders is afgesproken met de behandelend (kinder)arts.

Belangrijke contactgegevens

- Polikliniek kindergeneeskunde, route H05, telefoon (053) 487 23 10.