

Likdoorn

Chirurgie

Inleiding

U heeft een afspraak bij de Chirurgie voor het verwijderen van een likdoorn (clavus). Deze folder geeft algemene informatie over deze behandeling.

Wat is een likdoorn?

Een likdoorn ontstaat als gevolg van een drukplek door schoeisel of door een standafwijking van de voet. Vaak wordt een likdoorn eerst behandeld door een pedicure. Zijn deze behandelingen niet voldoende, dan wordt u poliklinisch geopereerd.

Wat neemt u mee?

Voor uw afspraak in het ziekenhuis verzoeken wij u het volgende mee te nemen:

- geldig legitimatiebewijs, bijvoorbeeld een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs;
- bewijs van inschrijving van uw zorgverzekeraar of uw zorgpas;
- actueel medicatieoverzicht, verkrijgbaar bij uw apotheek;
- de afspraakbevestiging.

Vorbereiding

Voor deze ingreep hoeft u niet nuchter te zijn.

Meldt u zich tien minuten voor het afgesproken tijdstip bij de Behandelpolikliniek Chirurgie.

Het is verstandig om een rolstoel uit de centrale hal mee te nemen, aangezien u na de ingreep uw voet hoog moet houden. Wij vragen u om een begeleider mee te nemen, die u na de ingreep naar huis kan brengen. Door de behandeling is zelfstandig naar huis reizen per auto, fiets of openbaar vervoer onverantwoord.

Behandeling

Over het algemeen wordt de likdoorn verwijderd door de lagen eelt weg te snijden en de kern eruit te halen. De wond hoeft niet gehecht te worden. Soms wordt een likdoorn in zijn geheel eruit gesneden, de wond wordt dan wel gehecht.

Na de behandeling

Na de behandeling wordt er eerst een siliconen gaas op de wond gelegd. Dit voorkomt dat de andere gazen aan de wond plakken. Drukontlasting rondom met vilt. Over deze gazen komt een drukverband, dit moet u twee dagen laten zitten.

Bij ontslag uit ons ziekenhuis krijgt u een slofje over het drukverband om het verband te beschermen. Het slofje dient u er bij thuiskomst af te halen, om te voorkomen dat uw voet gaat zweten.

Om zwelling te voorkomen, adviseren wij u om uw voet op de dag van de ingreep zoveel mogelijk hoog te houden.

Heeft u na de ingreep veel pijn, dan mag u paracetamol (500 mg) innemen tot maximaal vier maal daags één of twee tabletten om de 6 uur.

Controleafspraak

U krijgt een controleafspraak mee voor een week na de ingreep. Op polikliniek Chirurgie controleert een verpleegkundige dan uw wond en wordt uw verband eventueel verwisseld. Er wordt dan ook gekeken of er een volgende controleafspraak nodig is.

Ook krijgt u een verwijzing mee voor een podotherapeut, om te kijken of u drukplekken op uw voet heeft. Zooltjes in uw schoenen kunnen een nieuwe likdoorn voorkomen.

Meestal is de pijn na twee weken verdwenen.

Mogelijke complicaties

Zoals bij iedere ingreep, kunnen ook bij de behandeling van een likdoorn complicaties optreden. Gelukkig komen deze niet vaak voor en kunnen ze meestal verholpen of behandeld worden.

Mogelijke complicaties zijn:

- nabloeding;
- infectie.

(Pijn)klachten

Heeft u wondproblemen, ernstige pijnklachten of andere vragen, dan kunt u altijd tijdens kantooruren contact opnemen met de polikliniek Chirurgie. Bij acute problemen 's avonds en in het weekend kunt u contact opnemen met het algemene nummer van het ziekenhuis (053 4872000), de receptionist(e) zal u doorverbinden met de arts assistent chirurgie. Dit geldt alleen voor problemen die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag.

Belangrijke contactgegevens

Onderstaande routes en telefoonnummers kunnen voor u van belang zijn:

Poliklinieken Chirurgie

- Algemene Chirurgie, route B11, telefoon (053) 4 87 34 40.
- Chirurgie Oldenzaal, route 159, telefoon (053) 4 87 34 40.

Behandelpolikliniek Chirurgie (tevens nacontrole), telefoon (053) 4 87 33 20.

- Enschede, route C16.
- Oldenzaal, route 159.

Tenslotte

U heeft recht op juiste en volledige informatie. Pas als u voldoende inzicht heeft, kunt u weloverwogen toestemming geven voor een bepaalde behandeling of een bepaald onderzoek. Als iets u niet geheel duidelijk is, vraagt u de specialist, verpleegkundig specialist of verpleegkundige dan om nadere uitleg.