

Adviezen na gebitssanering

Kaakchirurgie & Bijzondere Tandheelkunde & Kindergeneeskunde

Inleiding

Nu uw kind behandeld is, is het om een spoedig herstel van uw kind te bevorderen van belang dat u deze folder goed doorleest en adviezen nauwkeurig opvolgt. Uiteraard behoeven de beschreven klachten niet altijd voor te komen. Deze folder geeft algemene informatie over adviezen na gebitssanering.

Behandeling

Voor de behandeling worden er eerst röntgenfoto's genomen. Met behulp van deze foto's wordt het behandelplan gemaakt: tanden en kiezen kunnen worden geseald (laklaagje), gerestaureerd (vulling) of worden verwijderd.

Eten en drinken

Geef u de eerste zes uur na de ingreep geen zeer warm en of zeer koud drinken aan uw kind. Om de wonden te ontzien, kunt u de eerste dagen na de ingreep beter geen hard voedsel geven.

Mondhygiëne

De wond geneest het beste wanneer het bloed goed kan stollen. Daarom mag u de eerste 24 uur de mond van uw kind niet spoelen. Probeer u ook te voorkomen dat uw kind met de vingers in de mond komt. Een schone wond geneest beter dan een vieze.

De volgende dag kunt u de tanden en kiezen van uw kind weer gaan poetsen met een zachte tandenborstel, maar wees voorzichtig in de buurt van de wond.

Napijn

Na de behandeling is het normaal dat uw kind pijn heeft. U kunt uw kind rustig een paracetamol geven volgens afspraak. De verdoving is na twee tot vier uur uitgewerkt.

Let op dat uw kind niet gaat zuigen of bijten op de lip of wang als de verdoving nog niet is uitgewerkt; uw zoon of dochter voelt dit niet en kan zo de lip of wang kapot maken.

Nabloeding

In geval van een nabloeding moet uw kind gedurende 30 minuten de mond stevig dichtbijten op een dubbelgevouwen verbandgaas of een zakdoek. Bloedt het aan de zijkant, dan kunt u een gaasje met uw vinger er tegen aan drukken. U mag geen watten gebruiken of tussendoor kijken of het gestopt is. Stopt het bloeden niet, herhaal dan deze procedure. Helpt het dan nog niet, neem dan contact op met de polikliniek Bijzondere Tandheelkunde, na 16.30 uur met de Huisartsenpost Enschede.

Hechtingen

Meestal wordt er gehecht met materiaal dat na twee tot drie weken vanzelf oplost. Als dat niet het geval is, dan krijgt u een afspraak om de hechtingen te laten verwijderen.

Naar huis

Als uw kind goed drinkt en niet misselijk is, mag hij weer mee naar huis.

Bij vragen, nabloeding of hoge temperatuur kunt u tot 16.30 uur contact opnemen met de polikliniek Bijzondere Tandheelkunde, telefoon (053) 487 27 10.

Buiten kantooruren neemt u contact op met de Huisartsenpost te Enschede, telefoon (088) 555 11 88.



Belangrijke contactgegevens

- polikliniek Bijzondere Tandheelkunde, route A17, telefoonnummer (053) 487 27 10;
- Huisartsenpost Enschede, route via Beltstraat 70, telefoonnummer (088) 555 11 88;
- Kinder- en Tienerafdeling, route H31, telefoonnummer (053) 487 23 78.

Tenslotte

U(w kind) heeft recht op juiste en volledige informatie. Pas als u voldoende inzicht heeft, kunt u wel overwogen toestemming geven voor een bepaalde behandeling of een bepaald onderzoek.

Als iets u niet geheel duidelijk is, vraagt u de behandelend arts of verpleegkundige dan om nadere uitleg.

Meer informatie over de rechten van ouders en kinderen en het geven van toestemming voor behandeling en / of onderzoek vindt u in het opnameboekje van de Kinder- en Tienerafdeling en op de website van ons ziekenhuis:

www.mst.nl/kindergeneeskunde