

## Behandeling met Proluton

### Gynaecologie

#### Inleiding

Uw specialist heeft u Proluton voorgeschreven. Om deze medicatie goed te kunnen gebruiken, is het belangrijk dat u er een aantal dingen over weet. Lees daarom behalve deze folder ook de bijsluiter. Deze folder geeft algemene informatie over Proluton.

#### Wat is Proluton?

Proluton is een geneesmiddel dat via een injectie worden toegediend. Proluton is een hormoon dat lijkt op het natuurlijke hormoon progesteron. Dit hormoon wordt bij niet zwangere vrouwen door de eierstokken aangemaakt. Ook in het begin van de zwangerschap maken de eierstokken progesteron aan, later gebeurt dit door de moederkoek. Progesteron zorgt er tijdens de zwangerschap voor dat samentrekkingen (contracties) van de baarmoeder onderdrukt worden. Mogelijk speelt een tekort aan het natuurlijke hormoon progesteron een rol bij vroeggeboorte.

Al vele jaren gebruiken zwangere vrouwen verschillende vormen van progesteron. Sinds enkele jaren wordt het hormoon ook voorgeschreven aan zwangere vrouwen die te vroeg zijn bevallen.

Omdat progesteron door zoveel zwangere vrouwen is gebruikt, zijn effecten op het kind uitgebreid onderzocht. Tot nu toe zijn er geen aanwijzingen voor schadelijke effecten, indien met toediening gestart wordt na 16 weken. Uit onderzoek blijkt dat het wekelijks toedienen van Proluton injecties bij zwangere vrouwen die een vroeggeboorte in de voorgeschiedenis kennen, de kans op een herhaalde vroeggeboorte vermindert en de duur van de zwangerschap verlengt. Vanwege dit gunstige effect en het ontbreken van nadelige bijwerkingen voor moeder en het ongeboren kind, adviseren wij u deze preventieve behandeling.

#### Het voorschrijven en de injecties

Proluton wordt op basis van een digitaal recept voorgeschreven door de arts. U kunt deze medicatie niet ophalen bij uw eigen apotheek, maar bij de ziekenhuisapotheek, route C01. De kosten kunt u meestal declareren bij uw eigen verzekering, u kunt dit bij uw verzekeraar navragen.

U krijgt wekelijks een injectie, de eerste in de zestiende week van de zwangerschap, de laatste in de zesendertigste week van de zwangerschap. Tussen twee injecties mag liever niet meer dan tien dagen zitten.

De injecties worden op de polikliniek gegeven door een doktersassistente of verpleegkundige van de behandelkamer Gynaecologie, route H03. Deze injecties worden standaard op dinsdagmorgen van 09.30 - 10.00 uur gegeven. Soms kan dit in combinatie met uw controle afspraak, maar dat zal helaas niet altijd mogelijk zijn.

De injectie wordt in een spier gegeven, vaak in de bilspier of in het bovenbeen. Het is raadzaam om de injectieplek wekelijks te wisselen, om irritatie van de injectieplek te voorkomen. Andere bijwerkingen van de injectie zijn misselijkheid en diarree, maar deze bijwerkingen komen niet vaak voor.

#### Belangrijke contactgegevens

Heeft u vragen of wilt u een (telefonische) afspraak maken, belt u dan van maandag tot en met vrijdag van 08.00 - 17.00 uur met:

- Polikliniek Gynaecologie, route H03, telefoon (053) 4 87 23 30.

#### Tenslotte

U heeft recht op de juiste en volledige informatie. Pas als u voldoende inzicht heeft, kunt u weloverwogen toestemming geven voor een behandeling of bepaald onderzoek. Als u iets niet geheel duidelijk is, vraagt u de behandelend specialist of verpleegkundig specialist om nadere uitleg.