

Behandeling met chemotherapie en immunotherapie Carboplatine / Pemetrexed + Nivolumab (1568)

Inleiding

U heeft een afspraak bij longgeneeskunde voor uitleg over een gecombineerde behandeling. Deze folder geeft algemene informatie over deze behandeling. Deze kuur bestaat uit een soort immunotherapie en twee soorten chemotherapie. Daarnaast worden nog enkele andere medicijnen voorgeschreven. Deze dienen ter ondersteuning van de behandeling, bijvoorbeeld om bijwerkingen te beperken.

Dagopname

De kuur wordt gegeven op de dagbehandeling E21.

Behandeling

Deze kuur wordt gegeven met een interval van \pm drie weken. Hier zijn uitzonderingen op. Dit wordt dan duidelijk aangegeven door uw behandelend specialist.

Labcontrole

Voor iedere chemokuur wordt bloed geprikt; hetzij een dag van tevoren of op de dag van een polibezoek aan uw longarts of verpleegkundig specialist. De volgende kuur start in principe 3 weken na dag 1 van de chemokuur op voorwaarde dat de bloeduitslagen goed zijn. Het kan zijn dat de bloeduitslagen onvoldoende zijn voor een volgende kuur. Dan wordt een chemokuur uitgesteld. Dit gebeurt vaker en heeft geen nadelige gevolgen voor het effect van de behandeling.

Beeldvorming

Na de derde behandeling wordt een CT scan gemaakt. Het vervolg en de frequentie van de scans wordt door uw behandelend arts met u besproken.

Besmetting

Resten van de chemotherapie kunnen 4 dagen na de toediening vanaf dag 1 in het lichaamsvocht (onder meer urine, ontlasting, sperma, braaksel en transpiratie) aanwezig zijn. In het ziekenhuis krijgt u adviezen hoe u hiermee kunt omgaan.

Bijwerkingen

Bij deze kuur kunnen bijwerkingen optreden. Indien deze optreden kunt u het beste contact opnemen met uw behandelend arts/ verpleegkundig specialist of oncologieverpleegkundige (casemanager).

De volgende bijwerkingen van de immunotherapie kunnen optreden:

- Vermoeidheid
- Misselijkheid
- Verminderde eetlust
- Huiduitslag
- Diarree

De volgende bijwerkingen van de chemotherapie kunnen optreden:

- De aanmaak van bloedcellen in het beenmerg kan tijdelijk worden geremd. Als gevolg daarvan kunt u bloedarmoede krijgen, vatbaar worden voor infecties en u kunt sneller blauwe plekken en/of een bloedneus krijgen.
- Gehoorafwijkingen.
- Deze kuur kan misselijkheid en braken veroorzaken.
- Het kan zijn dat u tijdelijk minder of geen trek heeft in eten.
- Uw smaak kan tijdelijk veranderen.

- Het slijmvlies van de mond kan ontstoken raken. U kunt daardoor blaasjes en pijn in de mond krijgen. Belangrijk is een goede mondverzorging.
- Het slijmvlies van de darm kan geïrriteerd raken. U kunt daardoor diarree krijgen.
- Obstipatie.
- Deze kuur kan vermoeidheid veroorzaken; ook na afloop van de gehele behandeling kunnen deze klachten aanhouden.
- Huiduitslag.
- Vasthouden van vocht.
- Deze kuur kan van invloed zijn op de seksualiteit en op uw vruchtbaarheid. De mate waarin is van vele factoren afhankelijk. Praat hierover met uw verpleegkundige en/of specialist.

SCHEMA CHEMOTHERAPIE /IMMUNOTHERAPIE EN INNAME MEDICATIE RONDOM DE CHEMOKUUR

IMMUNOTHERAPIE VIA INFUUS

Immunotherapie	DAG 1	Duur kuur
Nivolumab	X	Infuus 30 minuten

CHEMOTHERAPIE VIA INFUUS

Chemotherapie	DAG 1	Duur kuur
Carboplatine	X	infuus 30 minuten
Pemetrexed	X	Infuus 15 minuten

MEDICATIE RONDOM DE CHEMOKUUR

Medicatie	
Foliumzuur 0.5 mg	Dagelijks 1 tablet <i>Starten op de dag VOOR de eerste kuur Tot 3 weken na laatste pemetrexed innemen</i>
Vitamine B12 1000 µg	1 x per 9 weken een spuit <i>Starten op de dag van de eerste kuur Tot 3 weken na laatste pemetrexed innemen</i>

DAG voor de kuur DAG 0	
Dexamethason 4 mg	1 x 2 tabletten

DAG van de kuur DAG 1	
1 uur voor de kuur innemen	
Dexamethason 4 mg	1 x 2 tabletten
Granisetron 2 mg	1 x 1 tablet
Aprepitant 125 mg	1 x1 tablet

DAG 2 en 3 na de kuur	
Dexamethason 4 mg	1 x 2 tabletten
Aprepitant 80 mg	1 x1 tablet

DAG 4 en volgende	
Wanneer u nog misselijk bent: Metoclopramide 3 x daags 10 mg een half uur voor de maaltijd	

Belangrijke telefoonnummers / contactgegevens

- Binnen kantooruren: Poli longgeneeskunde: 053-4872610
- Buiten kantooruren: Receptie MST: 053-4872000

Aanvullende informatie

- informatiemap chemotherapie
- op de website van de patiëntenvereniging <https://www.longkankernederland.nl>

Tenslotte

U heeft recht op juiste en volledige informatie. Pas als u voldoende inzicht heeft, kunt u weloverwogen toestemming geven voor een bepaalde behandeling of een bepaald onderzoek. Als iets u niet geheel duidelijk is, vraagt u de behandelend arts of verpleegkundige dan om nadere uitleg.