

Diabetes Mellitus bij een kaakchirurgische ingreep onder narcose

Mondziekten, Kaak- en Aangezichts chirurgie

Inleiding

U heeft een afspraak bij de kaakchirurg voor een behandeling onder algehele narcose. Deze folder geeft informatie over de behandeling als u Diabetes Mellitus heeft.

Vorbereiding

Voor de poliklinische behandeling onder algehele narcose moet u nuchter zijn. Dit houdt in dat u 6 uur voor de geplande behandel tijd niet meer mag eten en 2 uur voor de geplande behandel tijd niet meer mag drinken.

Diabetes mellitus

Heeft u Diabetes Mellitus dan kunt u hierdoor problemen krijgen met uw bloedsuikerspiegel. Door uw medicijngebruik aan te passen kunt u problemen voorkomen. In deze folder leest u hoe u dit veilig kunt doen.

De volgende situaties zijn mogelijk

U gebruikt:

- Alleen bloedsuikerverlagende tabletten
- 1x daags Insuline
- Bloedsuikerverlagende tabletten in combinatie met 1 x daags Insuline
- 2 x daags Insuline
- 4 x daags Insuline
- Een Insulinepomp

Hoe gebruikt u uw diabetesmedicatie op de dag vóór de ingreep?

	Ochtend	Middag	Avond	23:00 uur
Bloedsuiker verlagende tabletten	Normale dosis	Normale dosis	Geen	Geen
1 x daags Insuline	-	-	-	Halve dosis
Bloedsuiker verlagende tabletten en Insuline	Bloedsuiker verlagende tabletten: normale dosis Insuline:-	Bloedsuiker verlagende tabletten: normale dosis Insuline:-	Bloedsuiker verlagende tabletten: geen Insuline: -	Bloedsuiker verlagende tabletten: geen Insuline: halve dosis
2 x daags Insuline	Normale dosis	-	Halve dosis	-
4 x daags Insuline	Normale dosis	Normale dosis	Halve dosis	Halve dosis
Insulinepomp	Normale dosis	Normale dosis	Normale dosis	Normale dosis

Hoe gebruikt u uw diabetesmedicatie op de dag van de ingreep?

	Ochtend *	Middag	Avond	23:00 uur
Bloedsuiker verlagende tabletten	Geen	Normale dosis	Normale dosis	Normale dosis
1 x daags Insuline	-	-	-	Normale dosis
Bloedsuiker verlagende tabletten en Insuline	Bloedsuiker verlagende tabletten: geen Insuline: -	Bloedsuiker verlagende tabletten: normale dosis Insuline: -	Bloedsuiker verlagende tabletten: normale dosis Insuline: -	Bloedsuiker verlagende tabletten: normale dosis Insuline: normale dosis
2 x daags Insuline	Halve dosis	-	Normale dosis	-
4 x daags Insuline	Halve dosis	Normale dosis	Normale dosis	Normale dosis
Insulinepomp	Basisstand zonder bolus	Normale dosis	Normale dosis	Normale dosis

* **Neem bij glucose lager dan 6 voor de ingreep: 2 dextrotabletten. Dit staat het nuchter zijn niet in de weg.**

Belangrijk

Neem naar het ziekenhuis uw medicijnen, dextrotabletten en een glucosemeter mee, zodat u op de dag van de ingreep zo nodig uw bloedglucose kunt meten en eventueel aan kunt passen.

Tenslotte

U heeft recht op juiste en volledige informatie. Pas als u voldoende inzicht heeft, kunt u weloverwogen toestemming geven voor een bepaalde behandeling of een bepaald onderzoek. Als iets u niet geheel duidelijk is, vraagt u de behandelend arts of verpleegkundige dan om nadere uitleg.

Vragen en contact

Bij vragen gericht op Diabetes Mellitus:
Polikliniek Interne Geneeskunde
Op werkdagen tussen 08:00 en 17:00 uur:
 Telefoon 053 487 2430

Voor overige vragen:
Polikliniek Mondziekten, Kaak- en Aangezichts chirurgie
Op werkdagen tussen 08:00 en 17:00 uur:
 Telefoon 053 487 2720

Buiten deze tijden/spoed:
 Telefoon 053 487 2000