



## Coloscopie met lavage bij patiënten met diabetes

### Maag-, Darm- en Leverziekten / Endoscopiecentrum

#### Inleiding

U krijgt een onderzoek van de dikke darm. Omdat u suikerziekte (diabetes) heeft, krijgt u deze aanvullende informatie. Het is belangrijk dat u de algemene folder ook doorleest. De informatie die daarin staat is belangrijk, vooral de instructies voor het gebruik van de laxeerdrank.

Meld bij het maken van de afspraak dat u suikerziekte heeft. Wij proberen het onderzoek dan in de ochtend te plannen, zodat uw suikerziekte het minst ontregeld raakt.

Houd rekening mee dat u een dag vóór het onderzoek wordt opgenomen in MST.

#### Medicijnen

Houdt u bij uw medicijngebruik rekening met het volgende:

##### Algemeen:

- Krijgt u last van een te laag suikergehalte (trillen, zweten, gapen), dan kunt u frisdrank met suiker of thee met suiker drinken.
- Controleer deze twee dagen regelmatig uw bloedsuiker. Lukt dit niet? Dan kan een verpleegkundige u helpen.

#### Bloedsuiker verlagende tabletten

Dag <b>voor</b> het onderzoek	Dag <b>van</b> het onderzoek
<ul style="list-style-type: none"><li>• Normaal ontbijten</li><li>• Helft van de normale hoeveelheid tabletten innemen</li><li>• Daarna alleen heldere vloeibare producten drinken</li><li>• Te laag suikergehalte? Drink frisdrank of thee met suiker</li><li>• 's avonds normale hoeveelheid tabletten innemen</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Niet ontbijten</li><li>• Geen tabletten innemen <u>voor</u> het onderzoek</li><li>• Alleen heldere vloeibare producten drinken</li><li>• Onderzoek in de <u>ochtend</u>-&gt; daarna normaal lunchen en tabletten innemen</li><li>• Onderzoek in de <u>middag</u>-&gt; normaal avondeten en tabletten innemen</li></ul>

#### Tweemaal daags insuliner therapie

Dag <b>voor</b> het onderzoek	Dag <b>van</b> het onderzoek
<ul style="list-style-type: none"><li>• Normaal ontbijten</li><li>• <u>2/3 deel</u> van de normale hoeveelheid insuline spuiten</li><li>• Daarna alleen heldere, vloeibare producten drinken</li><li>• 's avonds normale hoeveelheid insuline spuiten</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Niet ontbijten, heldere producten drinken mag wel.</li><li>• Infuus met glucose wordt aangesloten</li><li>• Daarna <u>1/2 deel</u> van normale hoeveelheid insuline spuiten</li><li>• Onderzoek in de <u>ochtend</u>-&gt; daarna normaal lunchen en rest van de ochtend insuline spuiten</li><li>• Onderzoek in de <u>middag</u> -&gt; daarna normaal avondeten en normale dosis insuline spuiten</li></ul>



## Viermaal daags insulinetherapie

Dag <b>voor</b> het onderzoek	Dag <b>van</b> het onderzoek
<ul style="list-style-type: none"><li>• Normaal ontbijten</li><li>• Normale hoeveelheid kortwerkende insuline spuiten (Humalog, Novorapid of Actrapid)</li><li>• Daarna alleen heldere, vloeibare producten drinken</li><li>• Een lunch eten met heldere, vloeibare producten (zoals Boullion) + <u>1/2 deel</u> kortwerkende insuline spuiten</li><li>• 's avonds heldere, vloeibare producten drinken + <u>1/2 deel</u> kortwerkende insuline spuiten</li><li>• Voor het slapen gaan <u>2/3 deel</u> van de normale hoeveelheid langwerkende insuline spuiten (Insulatard, Humuline NPH, Levemir, Lantus)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Niet ontbijten (nuchter zijn)</li><li>• Infuus met glucose wordt aangesloten</li><li>• Daarna normale hoeveelheid insuline spuiten</li><li>• Onderzoek in de ochtend-&gt; daarna normaal lunchen en normale hoeveelheid insuline spuiten</li><li>• Onderzoek in de middag -&gt; dan rond het middaguur de normale hoeveelheid insuline spuiten</li><li>• Vanaf de avond -&gt; normaal avondeten en normale hoeveelheid insuline spuiten</li></ul>

### Belangrijke contactgegevens

Onderstaande telefoonnummer is voor u van belang:

- polikliniek Maag-, Darm- en Leverziekten, Endoscopiecentrum, route D25, telefoon (053) 487 33 18.

### Tenslotte

U heeft recht op juiste en volledige informatie. Pas als u voldoende inzicht heeft, kunt u weloverwogen toestemming geven voor een bepaalde behandeling of een bepaald onderzoek. Als iets u niet geheel duidelijk is, vraagt u de behandelend arts of verpleegkundige dan om nadere uitleg.